




Jak úspěšně ošetřit osobu s PAS?

Daniela Zmeškalová


Proč nad tím bádat?

- každoroční nárůst
- často velmi obtížné navázání sociálního kontaktu, způsob komunikace a spolupráce
- neznámé prostředí, nepředvídatelnost, co bude následovat, bolest
- spolupráce multidisciplinárního týmu včetně rodičů a dětí s PAS



Čekání, příprava

- dodržujte jasně termíny, nenechte čekat
- samostatná **čekárna**, venku, v autě
- vyslechněte doprovod, pokud je to možné, bez přítomnosti pacienta a vytvořte si základní **charakteristiku** pacienta
- při **akutním** vyšetření si nechte **sepsat rodiče** informace o pacientovi
- **neobvyklé reakce** na určité **smyslové** podněty (přecitlivělost na zvuky, světla, doteky, nepřiměřené reakce na chutě, vůně a pachy)



Zpracování

Charakteristika dítěte

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Bydliště:

Zákonné zástupce:

Kontakt:

Poznámka:

Sociální chování

Reakce na blízkost dospělých, projevuje separační úzkost, reakce na blízkost jiných dětí, přijímá fyzickou pomoc, délka rozdíl mezi blízkými a cizími, v jeho chování se vyskytují zvláštnosti (nereaguje na sociální podnety nebo reaguje extrémně; sám kontakt neiniciuje, neraduje se ze společné činnosti, nedilí pozornost apod.); ochotně spolupracuje, podřídí se kladeným požadavkům; problémy s adaptabilitou (přizpůsobení se prostředí, problémy v přijímání změn, přerušení činnosti apod.).

Komunikace

Jakým způsobem komunikuje: verbálně – slova, jednoduché věty, neverbálně – navazuje oční kontakt, ukáže, co chce, chápe nebo používá mimiku a gestikulaci, používá alternativní komunikaci; řeči jsou patrné echolalie, má vlastní řeč, tvorí nová slova, používá naučené fráze. Rozumí mluvenému slovu (chápe jednoduché, opakující se pokyny, rozumí běžným i složitějším pokynům; je schopno pochopit informace spojené s vysvětlením postupu při lékařském zákuoru, verbální informace je nutné podpořit vizuálně).



VĚRA ČADILOVÁ, ZUZANA ŽAMPACHOVÁ

PACIENT S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V ORDINACI LÉKAŘE

za - ukázka

ti sebeobsluhy

musí být krmen, má nějaké rituály při jídle (jídla aliiři dotýkat, neži smichaná jídla, roli v přijímání o barva apod.); musí být oblékáno či se obleče saoblékání potřebuje dopomoc při zapnutí knoflíků ni tkanicek; obuje si boty, nosí pleny, občas dá nabebu, je vysazován, na WC se obslouží samostatně; používá ručník apod.

ovatelny, vyžaduje odměnu v průběhu činnosti ončení, co preferuje jako odměnu (jídlo, činnost, olepkov apod.).

uje radost či smutek, lze rozpoznat aktuální návodně výkyvy nálad, úroveň frustrační tolerance, vita, afektivní záchvaty, agresivita vůči okoli (zrání), autoagresivita apod.

ent s poruchou autistického spektra v ordinaci

Plán postupu

- seznamte pacienta a doprovod s **postupem ošetření**
- **říkejte, co máte v plánu** dělat, pokyny jednoznačné, ujistěte se, že člověk rozumí
- vyvarujte se **změnám** v jasně stanoveném postupu



Postup ošetření

- důkladný popis konkrétní činnosti
- **procesuální schéma**
 - předmětová forma



Ukázka předmětového procesuálního schématu

- obrazová forma



Ukázka procesuálního schématu ošetření zubů

- psaná forma

Příklad: EEG vyšetření

1. Při vstupu do ambulance pozdrav sestru: „Dobrý den“.
2. Posad se.
3. Poslouchej sestru, co ti bude říkat o vyšetření.
4. Prohlédni si čepici s elektrodami, kterou ti bude dávat sestra na hlavu.
5. Než ti sestra nasadí čepici, nanese na elektrody elektrogel.
6. Sestra ti dá na hlavu pružnou čepici s elektrodami.
7. Lehni si.
8. Poslouchej pokyny sestry, které musíš během vyšetření udělat.
9. Sestra ti bude říkat, abys zavřel a otevřel oči, sledoval záblesky, dýchal pouze nosem nebo pusou, a ty to vždy dle jejího pokynu uděláš.
10. Sestra ti řekne, až vyšetření skončí.
11. Sestra ti sundá čepici.
12. Utři si hlavu ubrouskem, který ti sestra podá.
13. Před odchodem z ambulance se rozluč se sestrou: „Na shledanou“.

Čadilová V, Žampachová Z: Pacient s poruchou autistického spektra v ordinaci lékaře, APLA Praha, 2012

Komunikace s pacientem

- vždy na úrovni porozumění pacienta
- respektujte **doporučení doprovodu** pacienta pro komunikaci s ním
 - „**překlad**“ sdělovaných informací, jasné pokyny
 - krátká sdělení, klidná intonace, příp. intonačně zvýrazněte stěžejní slova v jednotlivých větách
- nenechte se **zmýlit** věkem, formulacemi a frázemi v úvodní fázi rozhovoru
- časté problémy v porozumění a **sledování toku** řeči

„Dobrý den, neposadíte se?“

„Stresující, když v ordinaci je víc židlí a lékař řekne,
že se mám posadit a já nevím, kam, kdyby ukázal kam přesně,
odpadne třeba hned úvodní stres a pocit, že jsem za debila“



Tolerance zvláštního chování

- tolerujte projevy **zvláštního chování** včetně zvláštností v oblasti smyslového vnímání

Do ordinace vstoupil čtrnáctiletý statný chlapec s Aspergerovým syndromem a místo pozdravu hned spustil: „Co mi dnes budete dělat, kreténi?“ Lékař chlapce ošetřuje od raného dětství a zná jeho paradoxní reakce v krizových situacích, a proto na jeho poznámky nereagoval. Chlapec byl předem matkou připravován na odběr krve, věděl tedy, za jakým účelem do ordinace přichází. Lékař se na chlapce podíval a odpověděl: „Dobrý den, Karle, rád tě vidím. Určitě tě maminka informovala, co tě dnes čeká. Budeme odebírat krev.“ Poté začal Karel pobíhat po ordinaci a vykřikovat: „To tedy nikdy nepřipustím.“ Lékař ho klidným hlasem vyzval, aby se posadil. Karel ještě chvíli přecházel po místnosti a po chvíli se posadil. Důležité bylo, že lékař nenaléhal a nechal mu dostatek času na zpracování informace. Nebot lékař dobře znal zájmy chlapce a dopředu vše zkonzultoval s matkou, snažil se s Karlem navázat kontakt a odpoutat pozornost od vlastního výkonu. V poslední době chlapce zajímá vše o železniční trati

Čadilová V, Žampachová Z: *Pacient s poruchou autistického spektra v ordinaci lékaře, APLA Praha, 2012*



Dospělí pacienti s PAS

- **přizpůsobit** jednání i komunikaci (je-li bez doprovodu a ohlásí svou dg.)
- při vysvětlení postupu nebo informovaného souhlasu **vždy ověřit**, zda vše dobře **pochopil**
 - nestačí otázka: „*Rozumíte tomu?*“, ale dílčí kontrolní otázky k danému tématu tak, aby pacient neodsouhlasil něco, čemu nerozumí
 - při vysvětlování se vyvarujte používání abstraktních pojmu, kterým často lidé s PAS nerozumějí



Krizové situace

- při **afektivním a negativistickém chování**
 - zachovejte klid
 - dejte pacientovi prostor a čas pro zpracování informací, jeho zklidnění a vyrovnání se situací
 - pokud se pacient nezklidní, přerušte ošetření
 - navyšování tlaku na pacienta je kontraproduktivní
- **zklidňující prostředky a narkóza** jen v situaci nezbytně nutné
 - vysvětlit důvod použití
- zvážit nutnost hospitalizace pacienta s PAS; seznámit ošetřující personál s potřebami pacienta, ev. umožnit **přítomnost rodiče**



Kdy a co?

- **Před návštěvou**

- telefonát, **naplánovat** termín návštěvy, postup, popsat dřívější zkušenosti, spouštěče problémového chování, možnosti podpory dítěte (hračka, utišující předmět, piktogramy)

- **Během návštěvy**

- na začátku probrat **záložní plán**, kdy ukončit návštěvu nebo zavolat pomoc
- při stoupajícím napětí pacienta **zvážit nezbytnost** výkonů, probrat s rodičem
- raději vyšetření rozdělené do **několika návštěv** než jedna negativní zkušenost
- předem **popsat dítěti postup**, jednoduchá, přímá komunikace, **vizuální podpora**
- zvážit odměny při zvládání jednotlivých úkonů

- **Po návštěvě**

- telefonát, co pomohlo nebo návrhy pro další návštěvu
- ocenit dítě



daniela.zmeskalova@fnol.cz



Pan doktor Ryšánek - zubní lékař z Nové Bystřice - se svou manželkou se převlékli za pandu a tygříka, aby mohli ošetřit chlapce s autismem, který by klasický zákrok jinak nebyl schopen podstoupit nebo s velkými obtížemi. Z obrázku patrno, jak je Adam v pohodě po zákroku.